




作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	① かいよう病		
1月の発生量（現況）	(発生なし)並		
2月の増減傾向	↓		
増減傾向の根拠	発病葉率の平年の発生推移から、1月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）




防除のポイント

- ・本病はミカンハモグリガによる食害痕から侵入しやすい。
- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。


作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	② そうか病		
1月の発生量（現況）	やや多		
2月の増減傾向	↓		
増減傾向の根拠	発病葉率の平年の発生推移から、1月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）




防除のポイント

- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。

作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		
1月の発生量（現況）	並		
2月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	寄生葉率の平年の発生推移から、1月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



防除のポイント

- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状