




作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	① かいよう病		
予報	1 月の発生量（平年比）	並	
	12 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	並	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移 (→)	

調査結果


〈中央値〉




〈平均値〉



〈中央値〉




〈平均値〉




防除のポイント

- ・本病はミカンハモグリガによる食害痕から侵入しやすい。
- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。


作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	② そうか病		
予報	1 月の発生量（平年比）	やや多	
	12 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	やや多	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移 (→)	

調査結果

(発病葉率)



(葉の発病度)



防除のポイント

- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。


被害果→



作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	アブラムシ類		
予報	1 月の発生量（平年比）	—	
	12 月からの増減傾向	—	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	—	
	その他 (気象要因など)	—	



調査結果




- ・ 新梢数が基準に満たなかったため12月のデータなし


防除のポイント

- ・ テントウムシなどの天敵によって本種の増殖は抑えられるが、密度が高い場合には薬剤による防除を行う。
- ・ 新梢や新葉に寄生する。アリを探すことで、アブラムシの発見が容易になる。



作物	かんきつ（温州みかん）	地域	沖縄群島
病害虫名	ミカンハモグリガ		
予報	1 月の発生量（平年比）	—	
	12 月からの増減傾向	—	
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	—	
	その他 (気象要因など)	—	


調査結果




- ・ 新梢数が基準に満たなかったため12月のデータなし

防除のポイント

- ・ 被害葉にかいよう病が発生しやすいため、除去に努める。

作物	かんきつ（温州みかん）		地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類			
予報	1 月の発生量（平年比）	並		
	12 月からの増減傾向	↘		
予報の根拠	12 月の発生量（平年比）	並		
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移 (↘)		

調査結果



防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状