

# 不慎被咬后的处理方法

## 1 不慎被波布蛇咬伤时切勿惊慌，应立即确认是否确为波布蛇。

若无法分辨蛇的种类，也可通过伤口进行确认：如果是波布蛇类，牙齿的咬痕一般会有2处(也可能是1或3、4处)，咬后5分钟内伤口便会肿胀，且十分疼痛。

## 2 如确认是被波布蛇咬伤，请大声呼救，并立即前往医院进行治疗。

跑动将会导致毒性加速扩散，故请乘车前往医院或慢步前往医院。

## 3 如果去医院所需时间较长，请先轻轻地缠绕伤口，留下可供一根手指穿过的空隙。

请用绷带或领带等宽型布条轻轻缠绕在较为靠近心脏的伤口一侧的位置，以减少血液流动。每隔15分钟松开一次。**切勿用细绳等紧勒住伤口。**如果因恐惧心理而紧紧勒住伤口恐会导致血流停止，适得其反。



松弛地缠绕伤口，留下可供一根手指穿过的空隙。

※如需在山林中等远离医疗机构的地点进行作业，请务必结伴同行。以防万一，也请务必确认是否可以正常接收手机信号。

※为了能准确感知疼痛感及伤口情况，伤者切勿服用镇痛剂或饮酒。

### 波布蛇相关信息咨询处

◆ 冲绳县保健医疗部 卫生药务课

TEL.098-866-2055

◆ 冲绳县卫生环境研究所

TEL.098-987-8223

# 小心！ 波布蛇

冲绳县陆地上共栖息着24种蛇类，其中毒蛇有8种，但具有危险性的仅有波布蛇(原矛头蝮)、台湾原矛头蝮、冲绳烙铁头及琉球原矛头蝮4种。



波布蛇會因地域、個體、蛇皮狀態的不同，在顏色和紋路方面有所差異。



## 波布蛇的生态

### 波布蛇的活动

波布蛇为夜行性动物，日间多藏于洞穴等隐蔽场所，天黑后才外出行动。



### 波布蛇出没地点




波布蛇主要栖息在树林或草地中，但偶尔也会在住宅区的小公园等处出没。周围若有蛇洞或食物（鼠类），则可能会有波布蛇。

### 波布蛇的行动

波布蛇预备攻击时，上半身会缩成S型。S型部分快速伸直便会进行攻击。波布蛇无法跳跃。其体长的三分之二为最大攻击距离，因此只要在最大攻击距离外就能确保安全。



波布蛇擅长爬树及游泳，故请注意树上是否安全。



### 在深山游玩时的注意事项

波布蛇咬人事件中，仅有约5%发生在山林。但是，若在深山中被咬伤，前往医院治疗需要花费较长时间，故需特别注意。

### 危险毒蛇

- 台湾原矛头蝮**  
与琉球原矛头蝮极为相似（特定外来生物）。80~130cm
- 冲绳烙铁头**  
灰色或茶色底上覆盖黑色斑纹。40~80cm
- 波布蛇(原矛头蝮)**  
黄底或白底上有黑色斑纹。130~240cm
- 琉球原矛头蝮**  
茶色底上有黑色斑纹。80~120cm
- 冲绳腹链蛇**  
黑底白纹。80~110cm
- 虽为毒蛇，但危险性较低的蛇**
- 日本华珊瑚蛇**  
橙色与黑色相间的竖条纹上有白色横条纹。性格温和、很少咬人。40~55cm
- 琉球青蛇**  
背部绿色、腹部黄色。70~90cm
- 无毒蛇**
- 琉球红斑蛇**  
红黑条纹。130~180cm
- 台湾黑眉锦蛇**  
来自台湾的大型蛇类。定居于冲绳本岛中部。180~270cm
- 婆罗门盲蛇**  
全身呈亮灰色。居于土中，与蚯蚓极为相似。10~20cm
- 奄美高千穗蛇**  
背部褐色、腹部黄色。40~60cm