

関係機関長 殿

沖縄県病害虫防除技術センター所長  
( 公 印 省 略 )

### 病害虫発生予察注意報について

平成 28 年度病害虫発生予察注意報第 8 号を公表したので送付します。

---

## 平成 28 年度病害虫発生予察注意報第 8 号

- 1 作物名 さとうきび
- 2 害虫名 タイワンツチイナゴ
- 3 発生地域 沖縄群島、来間島
- 4 注意報発令の根拠
  - (1) 沖縄本島における 3 月中旬の調査の結果、新植夏植ほ場における成虫数は  $1\text{m}^2$  あたり 0.3 頭(例年 0.1 頭以下)、発生ほ場率は 45% (例年 22%) と例年より多かった。病害虫防除員の報告によると、南大東島でも一部ほ場において発生が多かった。
  - (2) 来間島における 3 月中旬の調査の結果、新植夏植ほ場における成虫数は  $1\text{m}^2$  あたり 1.5 頭(前年 1.5 頭)、発生ほ場率は 100%であった。
- 5 発生生態および被害
  - (1) タイワンツチイナゴは年一化性で、卵・幼虫は 5～6 月に、成虫は 6～8 月にかけて出現する(図 1、2)。
  - (2) 本種が多発すると葉の中肋だけを残し食害され甚大な被害となる(図 3)。さとうきび以外にも、ほ場周辺のイネ科の牧草や雑草を摂食する。
  - (3) 卵期に干ばつが続くと多発しやすい。
- 6 防除上注意すべき事項
  - (1) ほ場周辺のイネ科雑草は、若齢幼虫の好適な餌となるので除去に努める。
  - (2) 防除は幼虫期の実施が効果的なので、ほ場及び周辺の見回りを行い幼虫の早期発見に努める。
  - (3) 成虫防除を実施する場合には、活動の鈍い早朝に一斉防除を行うと効果的である。
  - (4) 薬剤散布の際は、近隣作物へのドリフト(飛散)に注意すること。



図1 幼虫(左)と成虫(右)



図2 卵塊



図3 サトウキビ葉の被害

---

★詳しくは沖縄県病害虫防除技術センターにお問い合わせ下さい★

TEL : (本所) 098-886-3880、(宮古駐在) 0980-73-2634、(八重山駐在) 0908-82-4933  
ホームページアドレス : <http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichuboj/index.html>