平成28年度病害虫発生予報第1号（4月予報）

＜今月のコラム＞　・4月に発生が予想される病害虫について
・梅雨の時期が近づいています

＜お知らせ＞　イネヨトウの性フェロモントラップにおける誘殺数の推移について以下URLに掲載しています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/documents/ineyo-phero.html


今月のトピックス

タバココナジラミ （かぼちゃ）
学名：*Bemisia tabaci*











生態と被害

本種は幼虫から成虫までの各ステージで吸汁し、卵、幼虫(1齢～ 3 齢)、蛹(4齢)を経て成虫となり、20 ～ 30 日程度で世代を繰り返す。葉の白化（シルバリング）や果実退緑を引き起こし、排泄物により、すす病を発生させることもある。定植初期から中期頃に被害が拡大しやすいので、葉裏を観察し早期防除に努める。薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。また、薬剤抵抗性の発達しにくい気門封鎖剤や微生物農薬も使用する。

http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119

平成28年3月25日
沖 縄 県 病 害 虫 防 除 技 術 セ ン タ ー