# 平成27年度病害虫発生予報第6号（9月予報）

＜今月のコラム＞　・夏植の植付時におけるイネヨトウの防除対策について
・キク立枯れ性病害の防除対策について
・エルニーニョ/ラニーニャ現象とは

＜お知らせ＞　イネヨトウの性フェロモントラップにおける誘殺数の推移について以下URLに掲載しています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/documents/ineyo-phero.html

## 今月のトピックス

## ナカジロフサヤガ （マンゴー）

学名：*Penicillaria jocosatrix*



新葉の被害




成虫



若齢幼虫




老齢幼虫

## 生態と被害

本種は熱帯・亜熱帯地域に分布し、マンゴーの害虫として知られる。幼虫はマンゴーの新葉を好んで食害するため、発生は新葉の出る時期に多くなる。

成虫の前翅長は11mm、雄の触角は強い鋸状、前翅は濃紫赤色、後翅は白色、外縁部は紫赤色である。卵は新葉に産まれ、ふ化幼虫は新葉を食害する。老齢幼虫は体色に薄緑色や紫色等の変異があり、昼間葉陰や葉梢の陰の部分に隠れ、夜間葉を食害するようになる。終齢幼虫は地面に下り地際付近の枯葉の中で蛹化する。

施設内への侵入を防ぎ、早期に発見・捕殺することが重要である。

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/index.html

平成27年8月27日
沖 縄 県 病 害 虫 防 除 技 術 セ ン タ ー