




作物	キャベツ	地域	沖縄群島
病害虫名	① コナガ		
調査結果	12 月の発生量 (例年比)	多	
予報	12 月からの増減傾向	↗	
	1 月の発生量 (例年比)	多	
予報の根拠		例年の発生量の推移 (↗)	

調査結果

寄生虫数の推移



・発生ほ場率60.0% (例年：40.0%)

防除のポイント

- ・発生源となりうるアブラナ科雑草の除去および、収穫後の残さ処理に努める。
- ・多発すると防除が困難になるので、低密度時に薬剤防除を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



作物	キャベツ	地域	沖縄群島
病害虫名	② チョウ目幼虫		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報	12 月からの増減傾向	↓	
	1 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (↓)	



モンシロチョウ

調査結果

寄生虫数の推移



- ・発生種：モンシロチョウ
- ・発生ほ場率20.0% (平年：12.0%)

防除のポイント

- ・発生源となりうる雑草の除去および、収穫後の残さ処理に努める。
- ・新しい食害痕を発見したら、速やかに薬剤を散布する。



ハスモンヨトウ



タマナギンウワバ