




| | | | |
|------------|--|----|---|
| 作物 | さとうきび | 地域 | 八重山群島 |
| 病害虫名 | ① メイチュウ類(カンシャシクイハマキ) | |  |
| 4月の発生量(現況) | 多 | | |
| 5月の増減傾向 | → | | |
| 増減傾向の根拠 | 芯枯茎率及びトラップ誘殺虫数の平年の発生推移から、4月と同程度の発生量と考えられる。 | | |


発生量の根拠(調査結果)





- ・ 調査作型：株出し、調査地域：石垣市
- ・ 芯枯茎率 (%)：12.8 (前年7.9、平年4.5、判定「多」)
- ・ 芯枯茎内幼虫の割合 (%)：カンシャシクイハマキ78.6、イネヨトウ21.4
- ・ フェロモントラップ誘殺虫数(頭/日)：5.1 (前年3.1、平年7.8、判定「やや少」)
- ・ 防除員による報告(メイチュウ類)：多発生(波照間島)、中発生(与那国島)

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間に散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植付時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。
- ・ 平成29年度病害虫発生予察注意報第6号参照。

| | | | |
|------------|--|----|---|
| 作物 | さとうきび | 地域 | 八重山群島 |
| 病害虫名 | ② メイチュウ類(イネヨトウ) | |  |
| 4月の発生量(現況) | 多 | | |
| 5月の増減傾向 | ↗ | | |
| 増減傾向の根拠 | トラップ誘殺虫数の平年の発生推移から、4月より発生量は増加すると考えられる。 | | |

発生量の根拠(調査結果)



- ・ 調査作型：株出し、調査地域：石垣市
- ・ 芯枯茎率 (%)：12.8 (前年7.9、平年4.5、判定「多」)
- ・ 芯枯茎内幼虫の割合 (%)：カンシャシンクイハマキ78.6、イネヨトウ21.4
- ・ フェロモントラップ誘殺虫数 (頭/日)：1.8 (前年1.2、平年2.1、判定「並」)
- ・ 防除員による報告(メイチュウ類)：多発生(波照間島)、中発生(与那国島)

防除のポイント

- ・ 卵は塊で産み付けられ、ふ化した幼虫は葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 定植及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。
- ・ 平成29年度病害虫発生予察注意報第6号参照。