




作物	さとうきび	地域	沖縄本島
病害虫名	① メイチュウ類 (カンシャシクイハマキ)		
予報	3 月の発生量 (平年比)	—	
	2 月からの増減傾向	—	
予報の根拠	2 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		


調査結果





- ・ 芯枯れ率発生状況：沖縄本島(6.3%)、伊是名村(15%)、伊平屋村(14.3%)、久米島町(17.3%)
- ・ 沖縄本島の茎内で発見したメイチュウ類の85% (34/40頭) がカンシャシクイハマキであった。

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。

作物	さとうきび	地域	沖縄本島
病害虫名	② メイチュウ類(イネヨトウ)		
予報	3 月の発生量 (平年比)	-	
	2 月からの増減傾向	-	
予報の根拠	2 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)		

調査結果



- ・ 芯枯れ率発生状況：沖縄本島(6.3%)、伊是名村(15%)、伊平屋村(14.3%)、久米島町(17.3%)
- ・ 沖縄本島の茎内で発見したメイチュウ類の15%(6/40頭) がイネヨトウであった。

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。