




| | | | | |
|-------|----------------------------|---|------|---|
| 作物 | さとうきび | 地域 | 沖縄本島 | |
| 病害虫名 | ① メイチュウ類(カンシャシクイハマキ・イネヨトウ) |  | | |
| 調査結果 | 4 月の発生量 (平年比) | | | 並 |
| 予報 | 4 月からの増減傾向 | | | ↗ |
| | | 5 月の発生量 (平年比) | 並 | |
| 予報の根拠 | | 芯枯茎率の平年の発生量の推移 (↗) | | |

調査結果


今期と平年の推移




過去 2 年の推移



トラップ調査 (カンシャシクイハマキ)



トラップ調査 (イネヨトウ)



- ・ 茎内で発見したメイチュウ類のうち、74% (35/47頭) がカンシャシクイハマキ、26%(12/47頭)がイネヨトウであった。

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間に散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。