





作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	バッタ類		
予報	11 月の発生量 (平年比)	少	
	10 月からの増減傾向	→	
予報の根拠	10 月の発生量 (平年比)	少	
	その他 (気象要因など)	平年の発生量の推移 (→)	

調査結果

今年と平年の推移




過去2年間の推移



・発生種：タイワンツチイナゴ


防除のポイント

- ・発生源となるほ場及び周辺の除草を徹底する。
- ・成虫防除を実施する場合には、活動の鈍い早朝に一斉防除を行うと効果的である。


作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	① メイチュウ類 (カンシャシクイハマキ)		
予報	11 月の発生量 (平年比)	並	
	10 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	10 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	芯枯茎率の平年の発生量の推移 (↗) トラップ誘殺虫数の平年の発生量	

調査結果


今年と平年の推移




宮古島



多良間島




伊良部島



- ・ 芯枯れ発生ほ場率：35.0% (平年値：37.4%)
- ・ 茎内で発見したメイチュウ類 (5頭) のうち、4頭 (80%) がカンシャシクイハマキであった。


防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。


作物	さとうきび	地域	宮古群島
病害虫名	② メイチュウ類(イネヨトウ)		
予報	11 月の発生量 (平年比)	並	
	10 月からの増減傾向	↗	
予報の根拠	10 月の発生量 (平年比)	並	
	その他 (気象要因など)	芯枯茎率の平年の発生量の推移 (↗) トラップ誘殺虫数が平年より多い	

調査結果


今年と平年の推移




宮古島



多良間島



伊良部島



- ・ 芯枯れ発生ほ場率：35.0% (平年値：37.4%)
- ・ 茎内で発見したメイチュウ類 (5頭) のうち、1頭 (20%) がイネヨトウであった。

防除のポイント

- ・ ふ化した幼虫は、葉裏や葉鞘部から下部に移動した後、地上部の芽や根帯から食入し、生長点を加害して芯枯れを起こさせ茎を枯死させる。
- ・ 加害による芯枯れを防止し有効茎を確保するため、培土時および生育初期の防除を徹底する。
- ・ ほ場内外のイネ科雑草は発生源となるため除去する。
- ・ 乳剤の場合は、葉鞘内に薬液がきちんと浸透するように丁寧に散布する。粉剤の場合は、茎と葉元の間散布し降雨や散水等により溶解させ、葉鞘内部へ浸透させることで防除効果が高まる。
- ・ 植え付け時及び培土時に土壌害虫の防除を兼ねた薬剤(粒剤)を選択し施用する。