



作物	さやいんげん(施設)	地域	宮古群島
病害虫名	① ミナミキイロアザミウマ		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報	12 月からの増減傾向	→	
	1 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠		例年の発生量の推移 (→)	

調査結果

成虫数の推移



・発生施設率20.0% (例年 : 20.0%)



防除のポイント

- ・施設の出入口や側窓は0.6ミリ以下のネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。
- ・施設周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。
- ・多発すると防除が困難になるので、早期発見・防除に努める。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

作物	さやいんげん(施設)		地域	宮古群島
病害虫名	② タバココナジラミ			
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	やや多		
予報	12 月からの増減傾向	↗		
	1 月の発生量 (平年比)	やや多		
予報の根拠		例年の発生量の推移 (↗)		

調査結果

成虫数の推移



・発生施設率20.0% (例年：30.0%)、一部施設で多発

防除のポイント

- ・多くの雑草が発生源となりうるので、施設内外の雑草除去に努める。
- ・施設開口部には目合い0.6ミリ以下の防虫ネットを展張し、本種の侵入を防止する。
- ・黄色粘着テープ等により、早期発見・防除に努める。
- ・幼虫は下位葉の葉裏に多いことに留意しながら薬剤散布を行う。
- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避け、気門封鎖系等の薬剤も利用する。



幼虫