


作物	さやいんげん(平張)	地域	沖縄群島
病害虫名	タバココナジラミ		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報	12 月からの増減傾向	→	
	1 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (→)	




調査結果

(中央値)




(発生ほ場率)




防除のポイント

- ・ ほ場周辺の雑草は発生源になるので除去する。
- ・ 本種はさやの白化を引き起こすので、出入口の防虫ネットを二重にするなどして、施設内への侵入を防止する。
- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
また、薬剤抵抗性の発達しにくい気門封鎖剤や微生物農薬を使用する。


作物	さやいんげん(平張)	地域	沖縄群島
病害虫名	① ミナミキイロアザミウマ		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	多	
予報	12 月からの増減傾向	↗	
	1 月の発生量 (平年比)	多	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (↗)	

調査結果

(平均)




(過去 2 年の発生推移)




防除のポイント

- ・ ほ場の出入口には二重カーテンなどを設置し、本種の侵入を防ぐ。
- ・ ほ場周辺の雑草は本種の発生源となるので、除草を行う。
- ・ 多発すると防除が困難になるので、発生初期の防除を徹底する。
- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



作物	さやいんげん(平張)	地域	沖縄群島
病害虫名	ハモグリバエ類		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報	12 月からの増減傾向	→	
		1 月の発生量 (平年比)	並
予報の根拠		平年の発生量の推移 (→)	

調査結果

(平均)




(発生ほ場率)



防除のポイント


- ・摘葉等による残さは成虫の発生源となるので、ポリ袋に入れるなどして、ほ場外に持ち出し処分する。
- ・本種は薬剤抵抗性が発達し、また野外に多数の在来天敵が存在することから、天敵に影響の少ない選択性殺虫剤を使用する。




作物	さやいんげん(平張)	地域	沖縄群島
病害虫名	② ハダニ類		
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	やや多	
予報	12 月からの増減傾向	↗	
	1 月の発生量 (平年比)	やや多	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (↗)	

調査結果

(平均)



(発生ほ場率)



防除のポイント

- ・ 薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。
- ・ 葉裏に多いことに留意しながら、丁寧に薬剤散布する。