




作物	かんきつ (タンカン)	地域	沖縄群島
病害虫名	① かいよう病		
5月の発生量 (現況)	並		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	発病果率の平年の発生推移から、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠 (調査結果)

(果実)



(葉)




防除のポイント



- ・本病はミカンハモグリガによる食害痕から侵入しやすい。
- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。



果実被害


作物	かんきつ (タンカン)	地域	沖縄群島
病害虫名	② そうか病		
5月の発生量 (現況)	(発生なし)並		
6月の増減傾向	↘		
増減傾向の根拠	発病葉率・発病果率の平年の発生推移から、5月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠 (調査結果)




防除のポイント

- ・罹病葉・枝は伝染源になるので除去する。

作物	かんきつ (タンカン)	地域	沖縄群島
病害虫名	アブラムシ類		
5月の発生量 (現況)	(発生なし) やや少		
6月の増減傾向	→		
増減傾向の根拠	寄生新梢率の例年の発生推移から、5月と同程度の発生量と考えられる。		


発生量の根拠 (調査結果)




防除のポイント

- ・テントウムシなどの天敵によって本種の増殖は抑えられるが、密度が高い場合には薬剤による防除を行う。
- ・新梢や新葉に寄生する。アリを探すことで、アブラムシの発見が容易になる。




作物	かんきつ (タンカン)	地域	沖縄群島
病害虫名	ミカンハモグリガ		
5月の発生量 (現況)	並		
6月の増減傾向	↓		
増減傾向の根拠	寄生新梢率の平年の発生推移から、5月より発生量は減少すると考えられる。		

発生量の根拠 (調査結果)




防除のポイント

- ・被害葉にかいよう病が発生しやすいため、除去に努める。
- ・被害が目立つ場合は薬剤による防除を行う。

作物	かんきつ（タンカン）	地域	沖縄群島
病害虫名	③ ハダニ類		
5月の発生量（現況）	やや多		
6月の増減傾向	↗		
増減傾向の根拠	寄生葉率の平年の発生推移から、5月より発生量は増加すると考えられる。		

発生量の根拠（調査結果）



- ・一部ほ場で多発した。
- ・防除員による報告：中発生（本島北部）

防除のポイント

- ・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。



ハダニの寄生による葉のかすれ症状