令和　7 年度　　6 月予報

作物	とうがん(施設・立体栽培)		地域	宮古群島
病害虫名	うどんこ病			
調査結果	5 月の発生量（平年比）	やや少		
予　報	5 月からの増減傾向	―		
	6 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果

発病葉率の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率20.0%（例年：36.4%）

防除のポイント

・多湿条件で発生し、その後乾燥が続くと被害が拡大するため、湿度管理に注意する。

・過繁茂を避け、透光通風を良くする。

・老葉や病葉は伝染源になるので除去し、施設外に持ち出し処分する。

・多発すると防除が困難になるため、予防散布に重点をおく。硫黄粉剤による予防は効果が期待できる。

令和　7 年度　　6 月予報

作物	とうがん(施設・立体栽培)		地域	宮古群島
病害虫名	ミナミキイロアザミウマ			
調査結果	5 月の発生量（平年比）	並		
予報	5 月からの増減傾向	―		
	6 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果

成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率80.0%（例年：63.6%）

防除のポイント

・本種はスイカ灰白色斑紋ウイルスを媒介する。
・多くの雑草が発生源となりうるので、施設内外の雑草除去に努める。
・施設の出入口や天窓は目合いの細かいネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。
・多発すると防除が困難になるので、つる先や葉裏をよく観察し、早期発見・防除に努める。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

令和　7 年度　　6 月予報

作物	とうがん(施設・立体栽培)		地域	宮古群島
病害虫名	タバココナジラミ		成虫	
調査結果	5 月の発生量（平年比）	並		
予報	5 月からの増減傾向	―		
	6 月の発生量（平年比）	―		
予報の根拠				

調査結果

成虫数の推移

＜今期と平年＞



＜過去２年＞



・発生施設率60.0%（例年：54.5%）

防除のポイント

・多くの雑草が発生源となりうるので、施設内外の雑草除去に努める。

・施設の出入口は目合いの細かいネット等で被覆し、成虫の侵入を防ぐ。

・黄色粘着テープ等により、早期発見・防除に努める。

・幼虫は下位葉の葉裏に多いことに留意しながら薬剤散布を行う。

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避け、気門封鎖系等の薬剤も利用する。

幼虫