




作物	レタス	地域	沖縄群島
病害虫名	① 菌核病		
調査結果	11 月の発生量 (平年比)	(発生なし)並	
予報	11 月からの増減傾向	→	
	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (→)	

調査結果


発病株率の推移



・発生ほ場率0% (平年 : 0%)



防除のポイント

- ・密植栽培を避けて、通風をよくする。
- ・被害株は菌核を形成しないうちに、早めに抜き取る。
- ・本病が発生しやすい作物での輪作・連作は避ける。
- ・多発生したほ場は、休閑期に天地返しや土壌消毒を行う。

作物	レタス	地域	沖縄群島
病害虫名	② アブラムシ類		
調査結果	11 月の発生量 (平年比)	(発生なし)並	
予報	11 月からの増減傾向	↘	
	12 月の発生量 (平年比)	並	
予報の根拠		平年の発生量の推移 (↘)	

調査結果

寄生株率の推移



・発生ほ場率0% (例年 : 10.0%)

防除のポイント

- ・植え付け時に粒剤を施用し、初期防除に努める。
- ・早期発見に努め、適宜薬剤散布を行う。
- ・ほ場周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。