




作物	レタス		地域	沖縄群島
病害虫名	① 菌核病			
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	やや多		
予報	12 月からの増減傾向	↗		
	1 月の発生量 (平年比)	並		
予報の根拠		平年の発生量の推移 (↗)		

調査結果


発病株率の推移



・発生ほ場率20.0% (平年：0%)、一部ほ場で多発



防除のポイント

- ・密植栽培を避けて、通風をよくする。
- ・被害株は菌核を形成しないうちに、早めに抜き取る。
- ・本病が発生しやすい作物での輪作・連作は避ける。
- ・多発生したほ場は、休閑期に天地返しや土壌消毒を行う。

作物	レタス		地域	沖縄群島
病害虫名	② アブラムシ類			
調査結果	12 月の発生量 (平年比)	やや多		
予報	12 月からの増減傾向	→		
	1 月の発生量 (平年比)	やや多		
予報の根拠		例年の発生量の推移 (→)		

調査結果

寄生株率の推移



・発生ほ場率60.0% (例年：0%)、一部ほ場で多発

防除のポイント

- ・ 植え付け時に粒剤を施用し、初期防除に努める。
- ・ 早期発見に努め、適宜薬剤散布を行う。
- ・ ほ場周辺の雑草は本種の発生源になるため除去する。