




作物	レタス	地域	沖縄群島
病害虫名	① 菌核病		
調査結果	2 月の発生量（平年比）	多	
予報	2 月からの増減傾向	↓	
	3 月の発生量（平年比）	やや多	
予報の根拠		平年の発生量の推移（↓）	

調査結果


発病株率の推移



・発生ほ場率60.0%（平年：26.0%）



防除のポイント

- ・密植栽培を避けて、通風をよくする。
- ・被害株は菌核を形成しないうちに早めに抜き取り、ビニール袋に入れるなどしてほ場外に持ち出し処分する。
- ・本病が発生しやすい作物での輪作・連作は避ける。
- ・多発したほ場は、休閑期に天地返しや土壌消毒を行う。

作物	レタス	地域	沖縄群島
病害虫名	② アブラムシ類		
調査結果	2 月の発生量 (平年比)	やや多	
予報	2 月からの増減傾向	→	
	3 月の発生量 (平年比)	やや多	
予報の根拠		例年の発生量の推移 (→)	

調査結果

寄生株率の推移



・発生ほ場率100% (例年：20.0%)

防除のポイント

- ・ 植え付け時に粒剤を施用し、初期防除に努める。
- ・ 早期発見に努め、適宜薬剤散布を行う。
- ・ ほ場周辺の雑草はアブラムシ類の発生源になるため除去する。