

## 【用語解説】

### 【力行】

- Go家（ごーや）運動  
青少年を飲酒・喫煙・深夜はいかいといった非行や、いじめ・性犯罪・交通事故被害等から守るため、帰宅の遅い子やいじめなどの被害に遭っているおそれのある子どもたちに対して声かけを行い、不審者の発見の際には関係機関へ通報するなど、地域が一体となって子どもたちを見守る運動。  
また、保護者にあっては、子どもたちに規則正しい生活習慣を身につけさせるほか、早めに帰宅し、子どもたちとの触れ合いの時間を大切にしようとする取り組み。
- 気になる子の有所見率  
乳幼児健康診査報告書を参考にした有所見率の求め方。  
(※沖縄県健康長寿課による独自の計算方法)  
・1歳6か月児  
精神発達遅滞（疑）（延） / 受診児全数 × 100  
・3歳児  
(精神発達遅滞（疑）（延） + 言語発達遅滞（疑）（延）) / 受診児全数 × 100
- 合計特殊出生率  
合計特殊出生率は「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

### 【サ行】

- 歯科SUN会議  
「沖縄県歯科スペシャル・うまんちゅ・ネットワーク会議」の省略である。沖縄県歯科スペシャル・うまんちゅ・ネットワーク会議は、障害者歯科医療の充実を通じて、本県の障害者の健康づくりに寄与し、障害者のQOLの向上を図ることを目的として、毎年関連するイベントや研修会なども開催している。
- 思春期保健相談士  
思春期の子どもたちに、専門的な知識とカウンセリングスキルを持ち、適切に対応しサポートするカウンセラーのこと。  
一般社団法人日本家族計画協会が認定している資格であり、国家資格ではない。
- 周産期  
周産期とは、妊娠満22週以降出生後1週未満までの期間のことをいう。
- 周産期死亡  
妊娠満22週（平成6年までは妊娠満28週）以後の死産と早期新生児死亡（生後1週未満の死亡）をあわせたものこと。
- 生涯未婚率  
生涯未婚率というのは、「45～49歳」と「50～54歳」未婚率の平均値から、「50歳時」の未婚率（結婚したことがない人の割合）を算出したものです。生涯を通して未婚である人の割合を示すものではない。
- 新生児死亡  
生後4週未満の死亡。
- スクールカウンセラー  
学校に配置され、児童・生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じるとともに、教師や保護者に対して指導・助言を行う専門家のこと。専門の資格はなく、精神科医のほか、学校教育相談学会が認定する学校カウンセラー、日本教育心理学会が認定する学校心理士、財団法人日本心理士資格認定協会が認定する臨床心理士などが配置されている。

スクールソーシャルワーカー  
ソーシャルワーカー（ケースワーカー）とは、主に社会的弱者への福祉相談業務に従事する福祉職専門家であり、スクールソーシャルワーカーは、その中で教育機関において当該の任に就く者のこと。資格要件は、社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者のほか、過去に教育や福祉の分野において活動経験がある者も含むなど、人材の専門性は様々なものとなっている。

## 【タ行】

低出生体重児  
低出生体重児とは、出生時の体重（出生体重）が2,500g未満（平成6年までは2,500g以下）の新生児のことをいう。出生体重が1,500g未満の新生児を極低出生体重児、1,000g未満の新生児を超低出生体重児といい、低出生体重児には極低出生体重児も超低出生体重児も含まれる。

特別支援コーディネーター  
発達障害者の特別支援をするための教育機関や医療機関への連携、その者の関係者(家族など)への相談窓口を行う専門職を担う教員のこと。

特定妊婦  
特定妊婦とは、出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のことをいう。  
具体的には、若年、経済的に問題がある、母子健康手帳の未発行、妊婦健康診査の未受診、多胎、妊婦の心身の不調等に該当する妊婦が挙げられる。

## 【ナ行】

乳児死亡  
生後1年未満の死亡。

乳幼児健康診査  
乳幼児健康診査は、乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診の総称のことで、母子保健（昭和40年8月18日法律第141号）第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査のこと。

乳幼児健診事後教室  
一般的には、乳幼児健康診査後の発達が気になる子のフォローや、早い段階での支援開始を目的として、読み聞かせや遊びのプログラム等を市町村が主体的に実施しているもの。

妊産婦死亡  
妊娠の期間及び部位に関係なく、妊娠またはその管理に関連した、あるいはそれらによって悪化したすべての原因による妊娠中、または分娩後42日（昭和53年までは産後90日）以内における女性の死亡のこと。（ただし、不慮の事故または予期せぬ偶然の原因による死亡は除く。）

## 【ハ行】

ハイリスク妊産婦  
「母児のいずれかまたは両者の重大な予後が予想される妊娠」と定義されており、妊産婦死亡・周産期死亡・周産期罹患の発生する可能性が高い妊婦・胎児を意味している。

発達障害  
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。

放課後児童クラブ  
保護者が労働などにより、昼間家庭にいない小学校に就学している概ね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に、児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。