



みゃ〜く使リ

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和4年3月発行
 沖縄県農林水産部
 宮古家畜保健衛生所
 宮古島市平良字西里1951
 TEL (0980) 72-3321
 FAX (0980) 72-6673

家畜飼養者の
みなさん

定期報告書の提出をお願いします

家畜伝染病発生時には、初動防疫を迅速に行うことが重要となります。そのため、**家畜の所有者は、毎年、畜舎の位置、家畜の頭羽数（2月1日時点）、衛生管理状況を県知事へ報告することが法律により義務付けられています。1頭（1羽）から報告が必要です。**

	畜種	提出期限
家畜	牛、水牛、鹿、馬、綿羊、山羊、豚、いのしし	毎年 4月15日
家きん	鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥	毎年 6月15日

◆**対象者**：対象家畜の所有者

◆**報告内容**

1. **基本情報**：所有者/管理者の名称、住所、連絡先、家畜の種類、頭羽数など

2. **飼養衛生管理基準の遵守状況**

3. **添付書類**：農場の平面図、飼養密度など

◆ **報告様式**：宮古家保、沖縄県HPからダウンロード


(<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/chikusan/eisei/teikihoukoku.html>)

◆ **提出先**：宮古家畜保健衛生所

問い合わせ先：宮古家畜保健衛生所 TEL：0980-72-3321

異常産ワクチンを接種する季節が近づいてきました！

牛に流行性異常産を引き起こすアルボウイルスは、吸血昆虫（ヌカカ）によって媒介され、夏から秋にかけて流行します。病気としては、「アカバネ病」、「アイノウイルス感染症」、「チュウザン病」があります。いずれの病気も治療法がなく、子牛の価値が失われるため、大きな損害となります。これらの病気は全て、ワクチン接種で予防することができます。このため、ヌカカが飛び始める前、今の時期にワクチン接種をして、発生を防ぎましょう。



ヌカカなどの吸血昆虫によってアルボウイルスが運ばれます。

感染



ワクチン	予防できる病気	接種について
アカバネ生ワクチン (900円)	アカバネ病	年1回の接種
3種混合不活化ワクチン (1400円)	アカバネ病 アイノウイルス感染症 チュウザン病	初めての場合は、 1ヶ月後に2回目の接種が必要

- ・ アカバネ生ワクチン・3種混合ワクチン共に、ワクチンの効果は1年間です。
- ・ ウイルスに対する免疫が低い若齢の母牛(未経産～3産)は**予防接種を毎年**することをおすすめします。

・接種対象外の牛
分娩1ヶ月前、妊娠鑑定前(種付け後1ヶ月以内)、治療中

問い合わせ先
宮古家畜保健衛生所
(TEL: 72-3321)

予防注射の申し込み先


- ・ 宮古島市の方は市畜産課へ (TEL: 79-7814)
- ・ 多良間村の方は産業経済課へ (TEL: 79-2503)

「牛白血病」は「牛伝染性リンパ腫」に名称が変更しました

牛伝染性リンパ腫対策をしよう！

牛伝染性リンパ腫ウイルスは感染牛の血液や乳汁に含まれています。ワクチンや治療法は今のところはありません。牛伝染性リンパ腫感染牛は生涯ウイルスを持ち続け、新たな感染源となります。

- 農場の清浄性を確認するため、定期的に検査を受けましょう。
- 導入牛は、検査を受けてから導入しましょう。




Q 感染牛がいる場合はどうすればよいか？

対策例


写真・図は「地方病性牛白血病（EBL）の発生・拡大防止に向けて（中央畜産会）」から引用



農場周囲に防虫ネットを設置



牛房間に防虫ネットを設置



農場見取り図
(感染牛と非感染牛の間に空間)

- 感染牛と感染していない牛を分離飼育
- 感染していない牛の導入（導入時の検査により感染していないことを確認）
- 吸血昆虫の忌避剤の使用、サシバエの駆除
- 除角、削蹄、耳標、鼻環取り付けの際の確実な止血。器具消毒、感染していない牛からの作業実施



宮古家畜保健衛生所
TEL 0980-72-3321
FAX 0980-72-6673

2022年

現場後代検定 種雄牛 紹介

脂肪交雑の改良に!

しげふき

茂福輝



直接検定成績 (11.8ヶ月齢時点)

体高(cm)	胸囲(cm)	胸深(cm)	かん幅(cm)	DG(kg/日)
121.2	164.0	59.0	41.5	1.05

血統

茂北福

北福波

北国7の8

しょうの

平茂勝

ふき

百合白清2

百合茂

(83.5)

ふくふく

福之国

生年月日：令和2年6月9日
生産者：畜産研究センター（今帰仁村）
審査得点：82.4点

ゲノム育種価(繋養牛25頭中)

枝肉重量	H	12位
ロース芯面積	H	10位
歩留基準値	A	13位
脂肪交雑	H	2位

美点
体伸 骨締まり 資質

交配奨励種雄牛

田尻系：美津照重・華春福

気高系：百合茂・幸紀雄

資質&体積に期待!

さきてるしげ

幸紀照重



直接検定成績 (11.1ヶ月齢時点)

体高(cm)	胸囲(cm)	胸深(cm)	かん幅(cm)	DG(kg/日)
123.0	164.0	59.0	41.0	1.08

血統

幸紀雄

百合茂

平茂勝

はつかね

金幸

たまよせ22

美津照重

美津照

(80.8)

さつま113

安福久

生年月日：令和2年1月11日
生産者：玉代勢元（竹富町）
審査得点：83.0点

ゲノム育種価(繋養牛25頭中)

枝肉重量	C	23位
ロース芯面積	H	15位
歩留基準値	H	9位
脂肪交雑	H	4位

美点
体上線 骨味 資質

交配奨励種雄牛

藤良系：北福波・福福波

気高系：勝群星・勝忠平

「牛白血病」は「牛伝染性リンパ腫」に名称が変更しました

牛伝染性リンパ腫対策をしよう！

牛伝染性リンパ腫ウイルスは感染牛の血液や乳汁に含まれています。ワクチンや治療法は今のところはありません。

牛伝染性リンパ腫感染牛は生涯ウイルスを持ち続け、新たな感染源となります。

- 農場の清浄性を確認するため、定期的に検査を受けましょう。
- 導入牛は、検査を受けてから導入しましょう。




Q 感染牛がいる場合はどうすればよいか？

対策例


写真・図は「地方病性牛白血病（EBL）の発生・拡大防止に向けて（中央畜産会）」から引用



農場周囲に防虫ネットを設置



牛房間に防虫ネットを設置



農場見取り図（感染牛と非感染牛の間に空間）

- 感染牛と感染していない牛を分離飼育
- 感染していない牛の導入（導入時の検査により感染していないことを確認）
- 吸血昆虫の忌避剤の使用、サシバエの駆除
- 除角、削蹄、耳標、鼻環取り付けの際の確実な止血。器具消毒、感染していない牛からの実施



宮古家畜保健衛生所

TEL 0980-72-3321

FAX 0980-72-6673