



# みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和7年3月発行  
沖縄県農林水産部  
宮古家畜保健衛生所  
宮古島市平良字西里1951  
TEL (0980) 72-3321  
FAX (0980) 72-6673



## 韓国で口蹄疫が発生！ 今一度、発生予防を徹底しましょう！



韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

### 韓国における口蹄疫の発生報告状況（2025年3月14日時点）

全羅南道（1件）  
3月14日  
霊岩郡 牛：1件※（約180頭飼育）

2025年3月14日(8:05)時点  
農林水産省動物衛生課

注：日付はWOAH報告の発生日  
ただし、WOAH未報告の場合は韓国当局公表日  
（疑い又は確定）とし、件数の後に※マークを記載  
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数



●：2025年発生地点  
●：2023年発生地点(参考)  
●：2019年発生地点(参考)

出典：韓国農林畜産食品部  
WOAH

牛農家の皆様へ発生予防の徹底をお願いします！



- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者以外の立入を制限しましょう。
- 農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。
- 畜舎の出入口に専用の靴の着用や踏込消毒槽等を設置することにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底しましょう。
- 従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。

毎日、飼養家畜の健康観察を行い、疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。

裏面もチェック！



## 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- ・畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒を設置し、使用**しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒



推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒し、フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

### ◎効果的な消毒のポイント

- ・踏込消毒槽の消毒液は、汚れて効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。
- ・農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。

### 《要注意》

- ★ 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！**

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～牛の症状～

写真：宮崎県提供

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果> 写真：動物衛生研究部門提供



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

牛では、**1頭のみに着目せず**、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、**群としての異状の有無を確認**することが重要です。

連絡先： 宮古家畜保健衛生所 0980-72-3321

# 牛異常産予防ワクチンについて


牛の異常産（流死産・奇形）を引き起こすアカバネ病、アイノウイルス感染症、チュウザン病、ピートンウイルスの予防として下記の3種類のワクチンがあります。ピートンもアカバネやアイノウイルスと同じグループで、同様の異常産の原因となります。ワクチンと吸血昆虫対策で異常産を予防しましょう！

ワクチン	効能	接種について
アカバネ病生ワクチン 900円／頭	アカバネ病	年1回
3種混合不活化ワクチン 1,400円／頭	アカバネ病 アイノウイルス感染症 チュウザン病	初回は2回接種 その後は年1回
4種混合不活化ワクチン 2,000円／頭	アカバネ病 アイノウイルス感染症 チュウザン病 ピートンウイルス	初回は2回接種 その後は年1回



異常産は  
大きな損失！

## ワクチンプログラム



■ 予防注射の申し込み先  
 宮古島市畜産課 TEL : 79-7814  
 多良間村産業経済 課 TEL: 79-2503

■ 問い合わせ  
 宮古家畜保健衛生所  
 TEL : 72-3321

この時季  
から

## 吸血昆虫対策をしましょう!!



### ○ サシバエ

飛翔能力 約4km!!

活動時期：春先～秋（涼しい時期は要注意!）

休息場所：草むらや木陰 体長：3～8mm

\*発生源：少し古めの糞

卵から2週間程度で成虫に!

寿命3ヶ月の間に800個産卵

#### ① 発生させない

・早めの除糞&適切な堆肥管理

堆肥は切り返しを行うと、乾燥と発酵熱(50℃以上)でウジを殺せます(石灰散布もOK)

・畜舎内を清潔に保つ

飼槽の食べ残し等を掃除しましょう



#### ② 幼虫のうちに駆除

・ウジ用の殺虫剤(IGR系)を発生源に散布(毎月最低2回)

堆肥舎、畜舎周辺のウジが好む場所(滑り止めマットの下、牛房の壁際など)

#### ③ サナギを見つけたら踏み潰す

・発生源周りの乾燥した場所において固い殻で覆われているため、薬剤が効きにくく、越冬もします

#### ④ 成虫対策

・ハエは耐性を獲得し、薬剤が効かなくなるので数種類をローテーションで使用

薬剤散布は夜～朝、雨の日が◎(ハエが畜舎にとどまっているタイミング)

・粘着シート、ハエ取りリボンなどハエの数に合わせて対応しましょう

### ○ ヌカカ \*発生源である水たまりをなくし、薬剤散布

活動時期：初夏～秋

休息場所：草むら等 体長：1～2mm



**病気を媒介**するだけでなく、**刺される痛みやかゆみのストレスで農場の生産性も低下**します。**防虫ネット設置**や畜舎周辺の**草刈り**にも努めましょう!

# 家畜人工授精所の開設者の皆様へ

家畜改良増殖法第34条第3項に基づく

## 家畜人工授精所の運営状況の 報告書の提出をお願いします。



家畜改良増殖法 \*一部抜粋

(報告の徴収等)

第三十四条 農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。

～ 略 ～

**3 家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。**

提出期限：**令和7年4月25日(金) ※期限厳守**

提出書類：\*報告様式：家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書(様式第28号)

\*対象期間：令和6年1月1日～12月31日

**※精液と受精卵の両方を扱っている場合は、それぞれ報告書を作成・提出**

提出方法：持参、FAX、電子メール又は郵送

提出先：宮古家畜保健衛生所 担当：長岡

〒906-0012 宮古島市平良西里1951

TEL:0980-72-3321 FAX:0980-72-6673

E-mail:aa017293@pref.oknawa.lg.jp(代表)

報告をしなかった又は虚偽の報告をした場合は、**立入検査の実施及び五十万円以下の罰金(家畜改良増殖法第三十九条第九項)に処する可能性があります。**

期限厳守で  
お願いします



# 沖縄県有種雄牛凍結精液 令和6年度 最終注文受付について

平素より、沖縄県有種雄牛凍結精液をご利用いただきありがとうございます。誠に勝手ながら、3月24日(月)～31(月)までの間は、新規注文の受付を停止させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

R6年度	最終注文受付	<b>R7年3月21日(金)17:00まで</b>
R7年度	注文受付開始	<b>R7年4月1日(火)08:30から</b>

精液のご注文 → 沖縄県家畜改良協会 TEL:098 - 987 - 0474  
 精液の払い出し → 宮古家畜保健衛生所 TEL:0980 - 72 - 3321

## 全国和牛能力共進会出品を 目指して県有種雄牛を 種付けしませんか？

**令和9年度  
北海道！！**

	生年月日	授精期間目安
第2区 (若雌の1)	R8年3月27日 R8年6月26日 生後14～17か月未満	<b>R7年6月15日</b> <b>R7年9月14日</b>
第3区 (若雌の2)	R7年12月27日 R8年 3月26日 生後17～20か月未満	<b>R7年3月17日</b> <b>R7年6月14日</b>

全共おすすめ県有種雄牛の一部をご紹介します。

注)授精期間目安は妊娠期間285日で算出

**もうすぐ第3区の  
種付時期始まります**

沖縄県  
種雄牛



# はくつるさくら 白鶴桜

R6年度  
選抜!!!

北海道全共用  
種付け推奨牛



糸桜  
系

## 美国桜 × 白鵬85の3 × 百合茂 × 安福久

生産地: 今帰仁村 生産者: 石川輔 生年月日: 令和元年6月21日

- 美国桜から**体積**が改良されている。飼料効率もよし◎
- **体型、肩付き**が良く前駆がしっかりしているため、母牛としての利用にも期待がもてる。
- 体型審査得点: **85.5点!** (県有種雄牛歴代最高)

### 推奨交配例

**気高系** 若百合、幸紀雄、紀多福、勝忠平、諒太郎、勝群星、夏百合

**糸桜系** 福之姫、北福波、茂北福

**田尻系** 安福久、美津照重、福増、華春福

※後駆が充実した母体におすすめ

※気高、田尻系はもちろん美国桜以外の糸桜系にも交配OK

※美国桜・白鵬母体、尻が小さい母牛も避けた方がよい

沖縄県  
種雄牛



さきてるしげ

# 幸紀照重

R7年度  
現場後代検定  
終了予定

北海道全共用  
種付け推奨牛



気高  
系

## 幸紀雄 × 美津照重 × 安福久 × 勝忠平

生産地:竹富町 生産者:玉代勢牧場 生年月日:令和2年1月11日

- 体上線の強さと骨締まり、資質、体伸の良さ◎
- 産子は体高が出て、足長に見える牛が多い
- ゲノム育種価(R6.5月解析)では、ロース芯、皮下脂肪、歩留まり、脂肪交雑が高い！

### 推奨交配例

**気高系** 百合茂、若百合、紀多福、勝忠平、諒太郎、白鵬85の3、百合白清2、勝群星

**系桜系** 福之姫、茂北福 **田尻系** 福増、華春福

※体積（特に深みと幅）のある母牛がおすすすめ

※気高系と系桜系に種付け推奨

※幸紀雄、美津照重母体は避けること