

## 和牛産肉能力間接検定成績

比嘉喜政 高江洲義晃

### I 緒 言

当場では、昭和58年度より種雄牛の遺伝的能力を判定し、産肉性の向上、肉質の改良を行う目的で和牛産肉能力検定（間接法）を実施しているので、平成2年度に同検定を終了した5頭の種雄牛について、その成績を報告する。

### II 検定牛および検定方法

検定した種雄牛は、肉用牛群改良基地育成事業により本県で作出した神林、晴茂、岩波、藤波の4頭と広島県より導入した丸山7で、その概要は表-1に示した。

検定方法は、全国和牛登録協会の和牛種雄牛産肉能力検定法（間接法）により実施した。間接法とは、検定する種雄牛についてその産子（去勢牛）を364日間肥育し、その間の増体量、飼料要求率および肉質等を調査するもので、今回はそれぞれ8頭の調査牛を用いた。

表-1 検定種雄牛の概要

番 号	1	2	3	4	5
名 号	神 林	晴 茂	岩 波	藤 波	丸 山 7
登録番号	黒原 1702	黒原 1703	黒原 1704	黒原 1841	黒原 1592
生年月日	S60. 2. 28	S60. 4. 10	S60. 4. 26	S61. 4. 5	S59. 10. 5
審査得点	82.7	82.2	84.0	81.8	85.0
産地	上野村	石垣市	城辺町	平良市	広島県
父	神 茂	糸富士	第3吾妻富士	安波土井	初代14
母	みねこ	第5しげる	ひでみ	ひめ3	第8まるやま
血統	父方祖父	第9の2神中	第7糸桜	乙社6	安美土井
	母方祖父	第16笠土	板持5	立川17の6	菊秀
					第31青滝
体型測定値	体高(cm)	147	145	154	150.6
	体長(cm)	185.3	173.5	194.6	168.8
	胸囲(cm)	222	232	243	222
	胸深(cm)	81.5	84	86	82.5
	尻長(cm)	57	62	64	62
	かん幅(cm)	56	62	58	50
	体重(kg)	852	938	1061	774
	検定終了年月日	H 2. 5. 11	H 2. 5. 11	H 2. 5. 25	H 2. 11. 16
					H 2. 11. 16

### III 検定成績

検定成績は、表-2に示すとおりであった。

#### 1. 増体成績

DG（全期間）について、晴茂は0.96kg、岩波は0.95kgと全国平均の0.87kgよりかなり優れていたが、神林、藤波、丸山7は全国平均より劣っていた。

#### 2. 飼料要求率等

飼料要求率(TDN)については、5頭とも全国平均(6.70)より優れていた。特に岩波は6.26とかなり優れていた。

粗飼料摂取率については、岩波が全国平均と同じ22%であった以外は4頭とも全国平均を下回っていた。特に、丸山7は15%とかなり低かった。

#### 3. と殺解体成績

最も重要な形質である脂肪交雑については、晴茂がBMS2.5で最も高く、藤波と丸山7が全国平均と同じBMS2.1であった。神林と岩波の脂肪交雫は全国平均をかなり下回っていた。

ロース芯面積については、丸山7が49.0cm<sup>2</sup>で全国平均(46.0cm<sup>2</sup>)を上回ったが、他の4頭は全国平均より小さかった。特に藤波は42.0cm<sup>2</sup>と小さかった。

バラの厚さについては、晴茂が6.7cmで最も厚く、最も薄い丸山7は5.7cmであった。皮下脂肪は、岩波だけが2.3cmと全国平均(2.0cm)より厚かった。筋間脂肪も岩波だけが5.8cmと全国平均(5.5cm)より厚かった。

推定歩留は、丸山7(74.0%)だけが全国平均(73.3%)より優れていた。

表-2 検定成績(検定材料牛の平均値)

	番号	1	2	3	4	5	全国平均
	名号	神林	晴茂	岩波	藤波	丸山7	(S62~63)
	開始時日齢	273.0	265.5	265.1	278.6	243.5	259.6
	開始時	278.1	254.8	270.0	251.5	231.1	—
体重	44週時	558.6	570.0	580.8	514.9	503.6	539.7
	終了時	576.8	602.9	615.5	548.3	535.4	579.3
D G	44週間	0.91	1.02	1.01	0.86	0.88	0.91
	全期間	0.82	0.96	0.95	0.82	0.84	0.87
体型測定値	体高(cm)	134.5	134.5	134.6	133.0	132.4	—
	胸深(cm)	71.7	73.6	71.3	—	—	—
	かん幅(cm)	51.1	51.7	50.1	47.2	47.6	—
飼料	濃厚飼料	2429	2744	2590	2490	2515	2473
	稻ワラ	270	305	288	267	279	—
摂取量	乾草	344	340	452	348	176	—
	合計	614	645	740	615	455	698
	粗飼料摂取量	20	19	22	20	15	22
飼料要求率	濃厚飼料	8.13	7.88	7.50	8.09	8.26	—
	粗飼料	2.05	1.85	2.14	2.07	1.50	—
	DCP	0.88	0.85	0.83	0.88	0.87	—
	TDN	6.68	6.42	6.26	6.66	6.55	6.70
と殺解	屠殺前体重(kg)	549.7	568.9	585.0	506.0	494.1	—
体成績	枝肉重量(kg)	348.8	367.3	371.3	328.0	323.0	350.0
	枝肉歩留(%)	63.4	64.6	63.6	64.7	65.4	—
	ロース芯面積(cm <sup>2</sup> )	44.1	43.6	45.6	42.0	49.0	46.0
	バラの厚さ(cm)	5.8	6.7	6.0	5.8	5.7	—
	皮下脂肪厚(cm)	1.9	1.9	2.3	1.9	1.7	2.0
	推定歩留(%)	72.9	73.3	72.7	72.9	74.0	73.3
	筋間脂肪(cm)	4.1	4.6	5.8	5.5	5.1	5.5
	脂肪交雑(BMS)	1.7	2.5	1.4	2.1	2.1	2.1

なお、これらの検定結果から晴茂と藤波は基幹種雄牛として選抜された。丸山7は牧牛として利用されることになった。神林と岩波については、淘汰することになった。

検定補助：宮里政人、久田友美