(技術名) ニガウリ種子由来のDNAを用いた効率的な遺伝子型判定法							
(要約) ニガウリ種子の種皮を除去し、胚の一部から抽出したDNAを用いることにより、種子の発芽能力を維持しながら遺伝子型を判定できるため、DNAマーカーによる効率的な個体の選抜が播種前に可能となる。							
農業研究センター・研究企画班、野菜花き班					連絡先	098-840-8513	
部会名	野菜・花き	専門	育種	対象	ニガウリ	分類	研究
普及対象地域							

[背景・ねらい]

ニガウリ育種において、雌性型やうどんこ病抵抗性などの重要形質について MAS (Marker assisted selection : DNA マーカー選抜育種法) による個体選抜を実施している。現在、幼苗期に葉から DNA を抽出しているため、定植までの短期間 (約2週間) に MAS を実施しているが、多検体からの DNA 抽出には時間を要しており、取り扱える検体数が制限されているといった課題を抱えている。そこで、雌性型判定 DNA マーカーを用いた個体選抜を例として、ニガウリ種子組織から DNA を抽出し、播種前に遺伝子型を判定する手法を開発する。

[成果の内容・特徴]

1. 乾燥種子の種皮を除去し、胚の先端部分 (2~3 mm) を DNA 抽出に用いることができる。胚の一部を切除した種子 (切除種子) は、個体識別のため 1.5 ml マイクロチューブに入れ、慣行の保存法と同様に 4℃ で保存する (図1)。
2. 種皮は、母親の遺伝子型を示すため (データ省略)、除去する必要がある。
3. 種子の遺伝子型 (バンドパターン) は、発芽後の本葉から抽出した DNA を用いた時と同一で、検出感度に差は認められない (図2)。
4. 切除種子は、種皮を除去した種子 (無切除種子) と比較して、保存3ヶ月後においても切除による発芽率の低下は認められない (図3)。
5. 切除種子の発芽苗は子葉の先端のみに切除跡が観察され、生育への影響は小さい (図4)。
6. 他の有用形質 (うどんこ病抵抗性および雑種性) を判別できる DNA マーカーでも活用できる (データ省略)。
7. 以上のことから、複数の DNA マーカーを用いて播種前から MAS を実施することが可能で作業が平準化できるため、現行よりも大規模な育種集団を取り扱うことができる。

[成果の活用面・留意点]

1. 本技術は、ニガウリ育種における MAS の効率化に活用する。
2. 供試した種子は、雌性型系統 OHB61-5 (雌花節率 100%) と混性型系統 OHB95-1A (雌花節率 3%) の F₂ 種子である。
3. DNA 抽出は DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen 社) を用いた結果である。

[具体的データ]

図1 ニガウリ種子からの遺伝子型判定の手順
背景の方眼マスは5 mm。

図2 アガロースゲル電気泳動による遺伝子型（バンドパターン）の判定結果の比較
同一レーンは同じ個体で上段は種子、下段は発芽後の本葉の判定結果を示す。*は雌性型の遺伝子型を持つ個体である。Mは1 kb Plus DNA Ladder (New England BioLabs社)である。

図3 切除種子の保存期間別の発芽能力
それぞれの試験区は32種子の3反復（合計96種子）で実施した。バーは標準偏差を示す。n.s.は、GLMM (binominal, logitリンク、ランダム効果：反復) による検定で有意差なしを示す。

図4 切除種子の発芽苗の様子
矢印は切除跡を示す。

[その他]

課題ID：2018農001

研究課題名：先端技術を結集した園芸品目競争力強化事業

予算区分：沖縄振興特別推進交付金（先端技術を結集した園芸品目競争力強化事業）

研究期間（事業全体の期間）：2021年度（2018～2021年度）

研究担当者：太郎良和彦、伊礼彩夏、儀間康造、宮城牧

発表論文等：伊礼彩夏ら（投稿中）沖縄県農研セ研報