

栽培漁業技術開発事業調査（要約） （タイワンガザミ）

渡辺利明

本調査の結果については、昭和59年度栽培漁業技術開発事業調査報告書、ハマフェフキ・タイワンガザミ（沖水試資料No83）に詳しく報告したので、ここでは要約を記す。

1. 100～1,000尾/ℓの条件でタイワンガザミ種苗の輸送密度試験を行なった。3時間後の死亡率は高密度区でも1.6～2.6%と低く、当面の種苗輸送密度100～200尾/ℓでは問題ないと考えられる。
2. 中間育成中の飼料、投餌量を検討するためタイワンガザミ稚ガニ（C₁～C₄）の餌料試験を行なった。餌料としてはアサリとオキアミを用いたが、両者に摂餌量、成長、生残率の差はなかった。摂餌量はC₁～C₄稚ガニでは体重の1～2倍程度であった。
3. 沖縄県水産試験場栽培漁業センターで生産したタイワンガザミ種苗を勝連町平敷屋地先と与那城村平安座地先の2ヶ所で中間育成した。中間育成方法は囲い網方式である。3回の中間育成での収容尾数は88,000～97,000尾であった。そのうち調査を行なった2回の中間育成では、稚ガニは7～11日間でC₃～C₄に順調に成長したが、生残率は1.6～7.0%と低かった。その原因としては、取り上げ・輸送時の不手際、中間育成場の干出、食害、囲い網破損による逸散高水温などが考えられた。
4. 放流した稚ガニは放流4日後にはまだ放流点付近に留まっているものが多かったが、16日後には殆どが分散した。この間稚ガニは放流時の甲幅7～10mm（C₃～C₄）から16日後の甲幅12～19mm（C₅～C₆）へと成長した。
5. 種苗生産したC₁～C₂タイワンガザミを用いて成長試験を行なった。稚ガニは5～7日間隔で脱皮し、試験開始後30日でC₆～C₇となった。以後13～23日間隔で脱皮をし128日後（ふ化後150日後）にはC₁₃となった。この時の甲幅は95mmであった。しかし11月以降は水温低下とともに脱皮が抑制されている。C₁₃までの成長式は、 $L = 0.19185t^{1.2879} + 4.4$ であり、甲幅-体重関係式は、 $W = 0.2164L^{2.6221}$ であった。
6. タイワンガザミの抱卵個体の多い時期は3～9月の長期に亘る。7月までは前年産群のみだが、8月以降は当才早期群が産卵に加わる。調査中の最小抱卵個体は甲幅104.4mmであった。
7. 漁獲されるタイワンガザミは7～8月までは前年産群が主であるが、7～8月には当才早期群が加入し、8～9月になると当才群が主となった。
8. 1984年9月21日から10月11日にかけて3回に亘りタイワンガザミ天然群成ガニの標識放流を与勝海域で実施した。総放流数は301尾で、その1.6%にあたる35尾が再捕された。80%以上は放流点から3km以内で再捕されたが、中城湾で再捕された個体も15%近くあり、与勝海域のタイワンガザミは中城湾のもの同かなり交流があることが予想される。今回の標識放流で

の最大移動距離は21～21.5 kmであった。

9. 与勝海域を漁場とする勝連、与那城漁協では沖縄県のカニ類漁獲量の14.6～21.4%にあたる13～27 tを漁獲していた(1980～82)。漁獲量は10～11月に最大になるが、これは当才群の資源加入によるものである。また当才早期群が漁獲サイズに達する8月にも多くなることがあった。
- 10 与勝海域の主要なタイワンガザミ漁場は藪地島東側、平安座島と浜比嘉島の水道北側、平安座島西側の3ヶ所で、水深10m以浅の砂泥底域である。