

漁海況情報

2000年(平成12年)9月

第334号

沖縄県水産試験場

901-0305 沖縄県糸満市西崎1丁目3番1号

電話 098-994-3593・3597

ファクシミリ 098-995-2357




図1 表面水温分布図(2000年9月19日)、表層平均流況図(大東行9/16-17、台湾行9/13-14)
資料：東シナ海海況速報(漁業情報センター)、だいとう(大東海運)、飛龍21(有村産業)

海況

天候：9月は北-北東の風が多く、全体の48%を占めた。沖縄本島地域では風速9-11m以上の予報日は9日で、中旬に台風14, 15号が接近した(琉球新報天気欄より)。

流況：9/13-9/17の観測結果では、那覇-大東間の大東よりで南西に流れていた。那覇-宮古間中央では南東に流れていた(定期船による観測結果：図1)。





図2 沖縄近海における表面水温偏差(目盛りは旬)
資料：西日本海況旬報(長崎海洋气象台)



表面水温：9/19(9/12~9/18)では、与那国島から八重山で26-28台、宮古島は26台、久米島・沖縄島西側は25-26台、南・北大東島は26台で、前月中旬より2ほど降温した(図1)。

与那国、久米島、沖縄島南、南北大東島周辺の表面水温の年間偏差を図2に示した。

9月の表面水温年間偏差

| | |
|------|------|
| 与那国 | 年間並み |
| 久米島 | 年間並み |
| 沖縄島南 | やや低め |
| 大東島 | やや低め |

漁況

パヤオ漁業：沖縄島南部海域ではキハダ、伊良部ではシビ、奄美群島ではカツオの漁獲が多かった。

*奄美海域の漁獲情報提供：鹿児島県大島支庁



ナンヨウカイワリ (ガーラ)

表1 9月のパヤオ漁業の漁協別漁獲量(t)

| 魚種名 | 糸満 | 港川 | 知念 | 沖縄市 | 計 | 伊良部 | 奄美群島 |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| シイラ | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 12.3 | 1.9 | 15.5 |
| カガキ | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.5 |
| 沖サワラ | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 0.4 | 6.3 |
| カツオ | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | 23.3 |
| キハダ | 18.1 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 29.2 | 15.2 | 1.1 |
| シビ | 16.7 | 5.8 | 5.8 | 12.5 | 40.9 | 20.7 | 52.9 |
| メバチ | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 7.8 |
| 計 | 45.4 | 13.2 | 13.8 | 19.4 | 91.9 | 45.2 | 107.4 |

糸満では、キハダ(10kg以上)が18.1t、シビ(10kg未満)が16.7t漁獲された。キハダは、港川で4.2t、知念で4.3t、沖縄市ではシビが12.5t漁獲された(表1)。

表2 6~10月のキハダ(10kg以上)漁獲量(t) 沖縄島南部4漁協合計(糸満・港川・知念・沖縄市)

| 年/月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 6-9計 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 1996年 | 15.4 | 20.9 | 30.6 | 21.2 | 15.8 | 88.1 |
| 1997年 | 32.8 | 38.2 | 28.4 | 15.4 | 54.6 | 114.8 |
| 1998年 | 48.3 | 43.9 | 69.4 | 22.9 | 18.4 | 184.5 |
| 1999年 | 37.9 | 46.8 | 27.8 | 26.3 | 36.9 | 138.8 |
| 2000年 | 25.9 | 6.5 | 29.0 | 29.2 | | 90.6 |

沖縄本島南部海域における過去5年間の7~11月期のキハダとシビ、シイラの漁獲量を表2~4に示した。

キハダの漁獲量は29.2tで、8月(29.0t)並みの漁獲だった。昨年の9月(26.3t)とほぼ同水準で例年並だった(図3)。

表3 6~10月のシビ(10kg未満)漁獲量(t) 沖縄島南部4漁協合計

| 年/月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 6-9計 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 1996年 | 29.8 | 30.6 | 59.5 | 48.3 | 30.4 | 168.2 |
| 1997年 | 29.5 | 29.5 | 16.0 | 13.1 | 16.0 | 88.1 |
| 1998年 | 20.5 | 35.3 | 53.4 | 42.7 | 34.4 | 151.9 |
| 1999年 | 24.3 | 28.7 | 35.3 | 25.2 | 21.2 | 113.5 |
| 2000年 | 40.8 | 31.4 | 20.9 | 40.9 | | 134.0 |

表4 6~10月のシイラ漁獲量(t) 沖縄島南部4漁協合計

| 年/月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 6-9計 |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 1996年 | 5.4 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 6.1 | 10.8 |
| 1997年 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 5.9 | 11.9 | 14.3 |
| 1998年 | 9.9 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 21.8 | 16.7 |
| 1999年 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 5.6 | 15.2 | 12.8 |
| 2000年 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 12.3 | | 19.7 |




図3 キハダの月別漁獲量の推移

定置網：9月の全体の漁獲状況は、8月(23.0t)に比べて少なかった。グルクマの漁獲が4割を占めた。




表5 9月の定置の主要魚種別漁獲(t)

| 魚種名 | 大型定置 | | | 小型定置 | | | 合計 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 読谷 | 知念 | 石川 | 与那原 | 勝連 | 与那城 | |
| ミズン類 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
| カマス | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| ヤマトガイ | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| ムロアジ | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| ガツン | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| ガーラ | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |
| グルクマ | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.0 |
| カツオ類 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| タチウオ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| アイゴ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |
| 合計 | 9.6 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 15.8 |