

ハリセンボン類

1984年-1986年は4月-7月に漁獲のピークがあったが、1987年はそれが明瞭でなく平均して漁獲された。1988年は1月-7月、10月-12月と漁獲が多く1984年-1987年の3倍ほど漁獲された。

アオリイカ類

12月-3月に漁獲のピークを持つ。そこで群が入れ替わる8月を境に漁獲量を集計する。1987年-1988年にかけての群の漁獲が最も多くなっているが、その量は最低年の1.5倍程度である。

コブシメ類

1月-4月に漁獲のピークをもつ。イカと同様に8月を境に漁獲量を集計する。1987年-1988年の漁獲量は最も多く、最低年(1984年)の3倍近い量となった。

6 人工礁調査

1988年8月4日に定点に沈設された1.5m角型コンクリート魚礁の調査を行った。表-16 に示すとおりの17種が確認された。

表-16 魚礁で確認された魚種のリスト

種類	い集数	備考
ハラヤガラ	1	
アヤマヒス	1	
ナミハタ	1	
キンガマシ	2	幼魚
クロホシエダイ	1	
ロクセンエダイ	20-30	
ヨスジエダイ	20-30	幼成魚
タデシマキンチャクダイ	1	幼魚
フウライチョウウオ	3	
トゲチョウウオ	1	
ツノガシ	3	
ハタテダイ	3	
ミツホシクロスズメ	30	
ホンソメケアラ	3	
ヒキアゴ	1	
アチアゲイ	1	
シマキンチャクダ	3	

表-14 アオリイカ漁獲量

漁期	漁獲量(Kg)
1984.8-1985.7	972.5
1985.8-1986.7	1385.6
1986.8-1987.7	1196.0
1987.8-1988.8	1612.1

表-15 コブシメ漁獲量

漁期	漁獲量(Kg)
1984.8-1985.7	706.5
1985.8-1986.7	1232.5
1986.8-1987.7	1196.0
1987.8-1988.7	1993.7