

Makaira mazara (JORDAN
et SNYDER) クロカジキ
(2回出現、2尾)

1973年7月のO-4に全長5.7
mm 1尾が出現、O-5に全長8.3 mm 1
尾が出現した。出現時刻は昼間で出現
点の表面水温は29.0°C、29.3°Cであった。

31. Acinaceide クロタチカマス科

(5回出現、6尾)
Acinaceidae gen. sp.

クロタチカマス科種不明

(5回出現、6尾)

冬期から夏期にかけて出現し、出現
海域は近海域、黒潮主流域、東支那海
域で、多くは丸特ネットの垂直びきに
出現した。出現個体の全長範囲は4.5
- 15.0 mmである。

32. Trichiuridae タチウオ科

(1回出現、1尾)

Trichiurus lepturus LINNÉ

タチウオ (1回出現、1尾)

1974年12月のO-4に全長7.4
mm 1尾が丸特ネットにより出現した。

33. Coryphaenidae シイラ科

(10回出現、20尾)

Coryphaena hippurus LINNÉ

シイラ (10回出現、20尾)

春期から秋期 (3-9月) に出現し、
出現盛期は夏期、出現海域は近海域、
黒潮主流域、東支那海域で主分布域は黒潮主流域から東支那海域、出現個体の全長範囲は4.5
- 34.2 mmでモードは16.1-18.0 mmにある。出現点の表面水温範囲は21.3-30.1°Cで
広い。

34. Lepidotidae シマガツオ科 (2回出現、2尾)

Taractes platycephalus MATSUBARA サガミマンザイウオ (2回出現、2尾)




Figure - 33 Monthly total length composition of larvae of Scomber sp.