

43. Sillaginidae キス科 (7回出現、16尾)

Sillaginidae gen. sp. キス科種不明 (7回出現、16尾)

いずれも湾内に出現し、出現盛期は冬期(1月)、出現個体の全長範囲は4.5—13.9mmである。なお沖縄近海にはシロギスは分布しておらず、ホシギスが分布しているので今回出現した稚仔魚はホシギスと思われる。

44. Girellidae メジナ科 (2回出現、2尾)

Girella punctata GRAY メジナ (2回出現、2尾)

1974年5月のO-5に全長14.1mm1尾、1973年2月のO-5に全長16.7mm、1尾が出現した。

45. Kyphosidae イスズミ科 (13回出現、24尾)

Kyphosus spp. イスズミ属種不明 (13回出現、24尾)

今回出現したイスズミ属はテンジクダイサキとイスズミが混在していると思われる。出現時期は夏期から冬期で出現盛期は秋期、全海域に出現し、主分布域は近海域から湾内にかけて、出現個体の全長範囲は3.2—19.4mmである。

46. Gerridae クロサギ (1回出現、5尾)

Gerres sp. クロサギ属 (1回出現、5尾)

1972年8月のA-10に全長範囲5.3—7.8mmの稚仔魚が5尾出現した。

47. Sparidae タイ科 (7回出現、53尾)

Acanthopagrus sivicolus AKAZAKI ミナミクロダイ (2回出現、12尾)

1月と2月の湾内に全長範囲4.2—8.0mm、12尾が出現した。

Acanthopagrus latus (HOTTUYN) キビレ (1回出現、1尾)

1972年8月の湾内に全長7.1mm1尾が出現した。

Sparidae gen. spp. タイ科種不明 (4回出現、40尾)

冬期から春期にかけて出現し、出現盛期は春期。近海域と湾内に出現し、主分布域は湾内である。出現個体の全長範囲は2.8—14.1mmである。

48. Aplodactylidae タカノハダイ科 (4回出現、6尾)

Goniistius zonatus (CUVIER et VALENCIENNES) タカノハダイ (4回出現、6尾)

1月に3尾、8月に1尾、11月に2尾出現した。主分布域は黒潮主流域である。出現個体の全長範囲は5.6—26.1mmである。

49. Parapercidae トラギス科 (2回出現、9尾)

Parapercidae gen. sp. トラギス科種不明 (2回出現、9尾)

湾内で3月に2尾、6月に7尾出現した。出現個体の全長範囲は5.1—13.1mmである。

Trachinina ワニギス亜目種不明 (3回出現、4尾)