

Erisphex potti (STEINDACHNER) アブオコゼ (1回出現、2尾)

1974年1月のO-6に全長20.0、21.1mm 2尾が出現した。

70. Platycephalidae コチ科 (4回出現、4尾)

Platycephalidae gen. sp. コチ科種不明 (4回出現、4尾)

すべて湾内に出現した。出現個体の全長範囲は2.3-7.0mmである。4月に1尾、9月に2尾、10月に1尾出現した。

Cottina カジカ亜目種不明 (5回出現、10尾)

秋期から春期にかけて出現し、出現盛期は冬期、出現海域は湾内を除く海域で、主分布域は東支那海域、出現個体の全長範囲は3.3-7.8mmである。

71. Echeneidae コバンザメ (1回出現、1尾)

Remora remora (LINNÉ) ナガコバン (1回出現、1尾)

1974年5月のB-8に全長27.5mm 1尾が出現した。

72. Gobiesocidae ウバウオ科 (3回出現、5尾)

Gobiesocidae gen. sp. ウバウオ科種不明 (3回出現、5尾)

秋期と冬期に出現し、出現海域は近海域と湾内、出現個体の全長範囲は10.3-11.5mmである。

73. Bothidae ヒラメ科 (3回出現、3尾)

Bothus sp. ホシダルマガレイ属種不明 (1回出現、1尾)

1973年5月のO-3に全長38.0mm 1尾が出現した。

Bothinae ダルマガレイ亜科種不明 (2回出現、2尾)

11月と12月のO-3にそれぞれ全長17.4mm、12.1mm、1尾ずつ出現した。

Pleuronectina カレイ亜目種不明 (6回出現、6尾)

四季を通して出現し、出現海域は湾内を除く海域で主分布域は東支那海域、出現個体の全長範囲は5.4-15.1mmである。

Soleina ウシノシタ亜目種不明 (2回出現、3尾)

7月のO-5に全長3.0、6.5mm、2尾が出現、11月のO-5に全長9.7mm 1尾が出現した。

74. Bregmacerotidae サイウオ科 (7回出現、9尾)

Bregmaceros sp. サイウオ属種不明

本土産のサイウオとは稚仔魚の黒色素胞の分布が違っている。秋期から冬期にかけて出現し、出現海域は湾内を除く海域である。出現個体の全長範囲は3.8-11.9mmである。

75. Lophiidae アンコウ科 (2回出現、2尾)

Lophius sp. キアンコウ属種不明 (2回出現、2尾)

11月のO-5に全長6.2mm 1尾、12月のB-2に全長4.2mm 1尾出現した。