

平成26年度病害虫発生予報第1号(4月予報)

<今月のコラム> 4月に発生が予想される病害虫について
梅雨の時期が近づいています

<お知らせ> イネヨトウの性フェロモントラップへの誘殺数の推移について以下URLに掲載しております。
<http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojournal/documents/h25-ineyo.html>

今月のトピックス

いもち病 (水稻) 学名: *Pyricularia grisea*

葉いもち



葉の初期症状



葉の長紡錘型病斑

穂いもち



穂いもちの症状

生態と被害

本病は水稻に発生する主要な病気の一つで、発生部位によって葉いもち、穂いもちに分けられる。葉いもちは、はじめ葉に楕円形、のちに縦に長いひし形の病斑ができる。穂いもちは、穂首の節に暗褐色の病斑ができ、上部が枯死する。

葉いもちは曇雨天が続くと多発し、窒素過多は発生を助長する。穂いもちは出穂期前後の低温多雨や多肥により感染が助長される。穂いもちは発生すると減収、品質低下を招ため、防除対策として出穂前の上位葉での葉いもちの発生を抑える。出穂前後の薬剤散布でいもち病菌の穂への侵入を防ぐことが重要である。

<http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojournal/index.html>